

衛署藥製字第 044248 號

G-7417

## 芙琳亞錠 15 毫克

### Folina Tablets 15 mg

(Folate 15 mg)

#### 【成分】

每錠含 Calcium Folate • 5H<sub>2</sub>O 19.06 mg

(約等於 Folate 15.0 mg)。

#### 【賦形劑】

Lactose Spray Dried、Microcrystalline Cellulose (Avicel ph105)、Pregelatinized Starch、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate

#### 【適應症】

超量使用葉酸拮抗劑時，消滅其毒性及抵消其作用、治療因斯潑盧營養缺乏、妊娠及其幼齡等引起之巨初紅血球性貧血。

#### 【使用方法、劑量】(本藥須由醫師處方使用)

##### — 高劑量 methotrexate 使用後的救助法

通常於 methotrexate 開始輸注給藥後 8~24 小時內施予 Folina 救助療法，每次口服 15mg(相當於 10mg/m<sup>2</sup>)；每 6 小時一次，連續給予 10 個劑量。

每天至少需檢測一次血清肌酸酐(creatinine)和 methotrexate 的血中濃度。除施予 Folina 救助療法外，並給予大量飲水或靜脈輸液及鹼化尿液使尿液之 pH 大於或等於 7.0，直至 methotrexate 的濃度小於 5x10<sup>-8</sup> M(0.05 micromolar)為止。

##### — 治療葉酸缺乏症

小於 12 歲之孩童：每天每公斤給予 0.25mg(0.25mg/kg/day)  
成人每天：10~20mg，以每日口服一錠 Folina(1 tablet/day) 最常使用。

#### 【禁忌症】

Folina tablet 不適用於治療因缺乏維他命 B12 所引起之惡性貧血或其它巨紅血球性貧血。

#### 【警語】

- 為了減輕 methotrexate 的臨床毒性時，Folina tablet 不可與 methotrexate 同時給藥，否則會喪失 methotrexate 的療效。但若與其他之葉酸拮抗劑如 Trimethoprim 及 Pyrimethamine 併用時並不會抑制其抗菌活性。
- 若病患有腹水、胸膜滲出液、腎功能障礙或 Hydration 不夠時會延遲 methotrexate 排出。如上述情況發生時，應考慮增加 Folina 劑量或延長治療時間。若建議劑量高於口服使用許可劑量應改以靜脈注射給藥。
- Calcium Folate 可能會增加 Fluorouracil 的毒性。

#### 【藥物交互作用】

- 大量的 Folic acid 可能會拮抗 Phenobarbital、Phenytoin 和 Primidone 藥品之抗癲癇作用；使病童發作次數增加。
- 高劑量的 Calcium Folate 可能降低 Methotrexate 髓鞘內投予的效果。
- Calcium Folate 可能增加 Fluorouracil 的毒性。

#### 【懷孕】：致畸胎作用

懷孕危險級數"C"。

尚未有動物的生殖影響研究報告。懷孕婦女投予 Calcium Folate 對胎兒是否造成傷害或對生育力的影響未知。

#### 【授乳】

尚未知是否會分泌於乳汁中，但基於許多藥物皆會分泌於乳汁，建議授乳婦應謹慎使用。

#### 【副作用】

不良反應很少見，但曾有過敏反應[包括：類過敏性反應(anaphylactoid reactions)、蕁麻疹(urticaria)]及注射給藥後發生發熱反應的報告。

#### 【過量】

應停止給藥。

【包裝】 2~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】 儲藏於室溫(25°C)下，請置於孩童無法取得之處。

【製造廠】 台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵區

【廠址】 基隆市七堵區工建西路 5 號

【公司地址】 台北市南港區園區街 3-1 號 3 樓

【電話】 0800086288